

爱丁堡视觉步态评分 (Edinburgh visual gait score, EVGS)

患者姓名: _____ 出生日期: _____ 诊断: _____ 评估日期: _____ 评估师: _____ 总分: _____ /34 左侧 / 右侧

站立相						摆动相					
	屈曲		正常	伸展			屈曲		正常	伸展	
	2	1	0	1	2		2	1	0	1	2
足						足					
1. 初始着地			足跟着地	平足着地	足尖着地	6. 足廓清			完全	减少	无
2. 足跟上提	无前足着地	延迟	正常	提前	无足跟着地	7. 最大踝背屈	过度背屈 (>30°背屈)	背屈增加 (16-30°背屈)	正常背屈 (15°背屈-5°跖屈)	中度跖屈 (6-20°跖屈)	明显跖屈 (>20°跖屈)
3. 最大踝背屈	过度背屈 (>40°背屈)	背屈增加 (26°-40°背屈)	正常背屈 (5°-25°)	背屈减少 (10°跖屈-4°背屈)	明显跖屈 (>10°跖屈)						
4. 后足内翻/外翻	重度外翻	中度外翻	中立位或轻微外翻	轻度内翻	重度内翻						
5. 足部旋转	较膝前角明显外旋 (>40°)	较膝前角中度外旋 (21-40°)	较膝前角轻微外旋 (0-20°)	较膝前角中度内旋 (1-25°)	较膝前角明显内旋 (>25°)°						
膝						膝					
8. 膝前进角	外旋, 髌骨部分可见	外旋, 髌骨完全可见	中立位, 髌骨中线	内旋, 髌骨完全可见	内旋, 髌骨部分可见	10. 摆动末期	重度屈曲 (>30°)	中度屈曲 (16-30°)	正常 (5-15°屈曲)	中度过伸 (4°屈曲-10°伸展)	重度过伸 (>10°伸展)
9. 站立相膝伸展峰值	重度屈曲 (>25°)	中度屈曲 (16-25°)	正常 (0-15°屈曲)	中度过伸 (1-10°)	重度过伸 (>10°)	11. 摆动相屈曲峰值	重度增加 (>85°屈曲)	中度增加 (71-85°屈曲)	正常 (50-70°屈曲)	中度减少 (35-49°屈曲)	重度减少 (<35°屈曲)
髌						髌					
12. 站立相伸展峰值	重度屈曲 (>15°)	中度屈曲 (1-15°屈曲)	正常 (0-20°伸展)	中度过伸 (21-35°伸展)	明显过伸 (>35°)	13. 摆动相屈曲峰值	明显增加 (>60°屈曲)	屈曲增加 (46-60°屈曲)	正常屈曲 (25-45°屈曲)	屈曲减少 (10-24°屈曲)	重度减少 (<10°屈曲)
骨盆											
14. 站立中期骨盆倾斜	明显下降 (>10°)	中度下降 (1-10°)	正常倾斜 (0-5°上提)	中度上提 (6-15°)	明显上提 (>15°)						
15. 站立中期骨盆旋转	明显旋后 (>15°)	中度旋后 (6-15°)	正常 (5°旋后-10°旋前)	中度旋前 (11-20°)	重度旋前 (>20°)						
躯干											
16. 矢状面峰值姿势	明显前倾	中度前倾	正常直立	中度后仰	N/A						
17. 最大侧方偏移	明显	中度	正常	减少	N/A						

其他情况记录: _____